

# 予防接種スケジュール おすすめプラン その1

## 受診する回数を最小限にするパターン（1度にたくさん接種するパターン）

### 生後2か月から1歳未満

#### <①定期接種のみ(基本パターン)>

ヒブ① + 肺炎球菌①  
↓ 4週あける  
ヒブ② + 肺炎球菌② + 四種混合①  
↓ 4週あける  
ヒブ③ + 肺炎球菌③ + 四種混合②  
↓ 3週あける  
四種混合③ + BCG

#### <②定期+ロタウイルス>

ヒブ① + 肺炎球菌① + ロタ①  
↓ 4週あける  
ヒブ② + 肺炎球菌② + 四種混合① + ロタ②  
↓ 4週あける  
ヒブ③ + 肺炎球菌③ + 四種混合② (+ ロタ③)  
↓ 3週 (ロタ③の場合は4週) あける  
四種混合③ + BCG

ロタウイルスワクチンは飲み薬です  
2回接種の製品と3回接種の製品があります

#### <③定期+B型肝炎ワクチン>

B型肝炎ワクチンの2回目の接種と  
3回目の接種の間隔に注意

ヒブ① + 肺炎球菌① + B型肝炎①  
↓ 4週あける  
ヒブ② + 肺炎球菌② + 四種混合① + B型肝炎②  
↓ 4週あける  
ヒブ③ + 肺炎球菌③ + 四種混合②  
↓ 3週あける  
四種混合③ + BCG  
↓ B型肝炎②接種後4-5か月  
B型肝炎③

#### <④フルパターン>

ヒブ① + 肺炎球菌① + ロタ① + B型肝炎①  
↓ 4週あける  
ヒブ② + 肺炎球菌② + 四種混合①  
+ ロタ② + B型肝炎②  
↓ 4週あける  
ヒブ③ + 肺炎球菌③ + 四種混合② (+ ロタ③)  
↓ 3週 (ロタ③の場合は4週) あける  
四種混合③ + BCG  
↓ B型肝炎②接種後4-5か月  
B型肝炎③



### 1歳

#### <①定期接種のみ(基本パターン)>

麻疹風疹(MR)① + ヒブ④ + 肺炎球菌④ + 水痘①  
↓ 3か月~半年あける  
水痘② + 四種混合④



\* 1回2本以下のパターンにも変更できます  
おすすめプランその2をご参照ください

#### <②フルパターン>

麻疹風疹(MR)① + ヒブ④ + 肺炎球菌④ + 水痘①  
↓ 4週あける  
おたふく① (+ 四種混合④)  
↓ 水痘①接種後3か月~半年あけて  
水痘② (+ 四種混合④)  
\* 四種混合④は おたふく①または 水痘②  
と一緒に



#### 3歳~4歳にかけて

日本脳炎①  
↓ 1-4週あけて  
日本脳炎②  
↓ 半年後(4歳)  
日本脳炎③

#### 小学校入学前(年長)

麻疹風疹(MR)②  
おたふく②  
(おたふく①から4~5年あけて)

#### 小学校入学後

2種混合  
日本脳炎2期  
HPV(ヒトパピローマウイルス)

# 予防接種スケジュール おすすめプラン その2

## 1回の受診で注射の本数を2本以下(両腕のみ)とするパターン

### 生後2か月から1歳未満

#### <①定期接種のみ> (基本パターン)

- ヒブ① + 肺炎球菌①  
↓ 4週あける
- ヒブ② + 肺炎球菌②  
↓ 1週あける
- 四種混合①  
↓ 3(～4)週あける
- 四種混合② + ヒブ③  
↓ 3(～4)週あける
- 四種混合③ + 肺炎球菌③  
↓ 1週あける
- BCG

#### <②定期+ロタウイルス>

- ヒブ① + 肺炎球菌① + ロタ①  
↓ 4週あける
- ヒブ② + 肺炎球菌②  
↓ 1週あける
- 四種混合① + ロタ②  
↓ 4週あける
- 四種混合② + ヒブ③(+ ロタ③)  
↓ 3週(ロタ③の場合は4週)
- 四種混合③ + 肺炎球菌③  
↓ 1週あける
- BCG

ロタウイルスワクチンは飲み薬です  
2回接種の製品と3回接種の製品があります



#### <③定期+B型肝炎>

- ヒブ① + 肺炎球菌①  
↓ 4週あける
- ヒブ② + 肺炎球菌②  
↓ 1週あける
- 四種混合① + B型肝炎①  
↓ 4週あける
- 四種混合② + B型肝炎②  
↓ 2週あける
- ヒブ③ + 肺炎球菌③  
↓ 2週あける
- 四種混合③ + BCG  
↓ B型肝炎②接種後4-5か月
- B型肝炎③

#### <④フルパターン>

- ロタリックス(2回接種)の場合
- ヒブ① + 肺炎球菌① + ロタ①  
↓ 4週あける
  - ヒブ② + 肺炎球菌②  
↓ 1週あける
  - 四種混合① + B型肝炎① + ロタ②  
↓ 4週あける
  - 四種混合② + B型肝炎②  
↓ 2週あける
  - ヒブ③ + 肺炎球菌③  
↓ 2週あける
  - 四種混合③ + BCG  
↓ B型肝炎②接種後4-5か月
  - B型肝炎③

#### <④フルパターン>

- ロタテック(3回接種)の場合
- ヒブ① + 肺炎球菌① + ロタ①  
↓ 4週あける
  - ヒブ② + 肺炎球菌② + ロタ②  
↓ 4週あける
  - ヒブ③ + 四種混合① + ロタ③  
↓ 4週あける
  - 四種混合② + B型肝炎①  
↓ 4週あける
  - 四種混合③ + B型肝炎②  
↓ 1週あける
  - 肺炎球菌③ + BCG  
↓ B型肝炎②接種後4-5か月
  - B型肝炎③



### 1歳

#### <①定期接種のみ(基本パターン)>

- ヒブ④ + 肺炎球菌④  
↓ 1週あける
- 麻疹風疹(MR)① + 水痘①  
↓ 水痘①から3か月～半年あけて
- 水痘② + 四種混合④



\*たくさん接種するパターンにも変更できます  
おすすめプランその1をご参照ください

#### <②フルパターン>

- ヒブ④ + 肺炎球菌④  
↓ 1週あける
- 麻疹風疹(MR)① + 水痘①  
↓ 4週あける
- おたふく① (+ 四種混合④)  
↓ 水痘①接種後3か月～半年あけて
- 水痘② (+ 四種混合④)  
\* 四種混合④は おたふく①または水痘②と一緒に



#### 3歳～4歳にかけて

- 日本脳炎①  
↓ 1-4週あけて
- 日本脳炎②  
↓ 半年後(4歳)
- 日本脳炎③

#### 小学校入学前(年長)

- 麻疹風疹(MR)②
- おたふく②  
(おたふく①から4～5年あけて)

#### 小学校入学後

- 2種混合
- 日本脳炎2期
- HPV(ヒトパピローマウイルス)